

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

Le présent dépliant contient des renseignements utiles sur DOXYTAB (hyclate de doxycycline). Veuillez le lire attentivement avant de prendre ce médicament. Si vous avez des questions au sujet de ce médicament ou de votre affection, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

ATTENTION : Ce médicament a été prescrit à VOTRE intention. N'en donnez pas à d'autres personnes, même si elles présentent des symptômes semblables aux vôtres; ce médicament pourrait leur nuire.

Qu'est-ce que DOXYTAB ?

Ce médicament porte le nom de DOXYTAB . Chaque comprimé DOXYTAB renferme 100 mg de doxycycline (hyclate de), à titre d'ingrédient actif. Il contient aussi les ingrédients inactifs suivants : cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, silice colloïdale, hydroxypropylméthylcellulose, propylèneglycol, dioxyde de titane, jaune n° 6 (F.D.C.), eau purifiée et cire de carnauba.

Les comprimés DOXYTAB sont des comprimés pelliculés, orange pâle, ronds et biconvexes. Ils portent l'inscription « PRO » au-dessus de « 100 » du côté sécable et uni sur l'autre.

Pourquoi prendre DOXYTAB ?

DOXYTAB est prescrit par le médecin pour traiter les infections bactériennes.

Quand ne pas prendre DOXYTAB ?

Vous ne devez pas prendre DOXYTAB:

- si vous êtes allergique à DOXYTAB, d'autres tétracyclines, ou à un ingrédient cité au début du présent dépliant;
- si vous souffrez de myasthénie grave (une maladie neuromusculaire auto-immune chronique qui cause une faiblesse musculaire).

Avant de prendre DOXYTAB

Avant de prendre ce médicament, vous devez informer votre médecin :

- si vous êtes enceinte ou avez l'intention de le devenir;
- si vous allaitez. DOXYTAB n'est pas recommandé chez les femmes qui allaitent. La tétracycline peut passer dans le lait maternel.
- si DOXYTAB est prescrit à un enfant, et qu'il est âgé de moins de 8 ans;
DOXYTAB n'est pas recommandé chez les enfants âgés de moins de 8 ans;
- si vous avez ou avez connu d'autres problèmes de santé, plus particulièrement :
 - vous avez de la difficulté à avaler, ou avez par exemple un rétrécissement ou une obstruction de l'œsophage (le conduit qui relie la bouche à l'estomac);
 - vous prenez d'autres médicaments, y compris ceux que vous achetez sans ordonnance dans une pharmacie, un supermarché ou une boutique d'aliments naturels.

Prendre DOXYTAB avec d'autres médicaments

- Il ne faut pas prendre DOXYTAB avec de l'alcool, des barbituriques, de la phénytoïne ou de la carbamazépine et du méthoxyflurane*

. * Le méthoxyflurane n'est pas commercialisé au Canada

Certaines substances médicamenteuses peuvent interagir avec DOXYTAB . Si vous prenez les médicaments ci-dessous, votre médecin décidera peut-être d'en modifier la posologie ou le mode d'emploi, ou encore de les remplacer :

- anticoagulants pris par voie orale
- pénicilline
- subsalicylate de bismuth
- antiacides renfermant de l'aluminium, du calcium ou du magnésium; ces agents diminuent l'absorption de DOXYTAB et ne devraient pas être administrés à des patients prenant DOXYTAB
- produits qui contiennent du fer; ces agents devraient être pris à un autre moment que DOXYTAB
- contraceptifs oraux; DOXYTAB peut en réduire l'efficacité.

Comment prendre DOXYTAB ?

Les antibiotiques, y compris DOXYTAB , ne doivent être utilisés que pour traiter les infections bactériennes. Ils ne sont pas efficaces contre les infections virales (p. ex. le rhume). Bien qu'il soit courant de se sentir mieux dès les premiers jours de traitement, il est important de continuer à prendre le médicament en suivant les instructions à la lettre. Si on omet de prendre des doses ou qu'on ne poursuit pas le traitement jusqu'à la fin, cela risque : (1) de réduire l'efficacité du traitement dans l'immédiat, et (2) d'augmenter la probabilité que la bactérie devienne résistante et ne puisse plus être éliminée par DOXYTAB ou d'autres antibiotiques dans le futur.

Suivez fidèlement les instructions de votre médecin en ce qui concerne les doses de DOXYTAB que vous devez prendre et le moment où vous devez les prendre.

Il faut avaler DOXYTAB, de préférence avec de la nourriture.

Quand prendre DOXYTAB ?

Il faut prendre DOXYTAB pendant ou après un repas, avec un verre d'eau entier, afin d'éviter les risques d'irritation ou d'ulcération de l'œsophage (le conduit qui relie la bouche à l'estomac).

Restez à la verticale (debout ou assis le dos droit), et ne vous allongez pas pendant au moins 1 à 2 heures, afin d'éviter une irritation directe de l'œsophage.

Que faire en cas d'oubli?

Si vous oubliez de prendre votre médicament (comprimé ou capsule) à l'heure prévue, prenez-le le plus rapidement possible à moins qu'il ne soit presque temps de prendre la dose suivante.

Dans ce cas, continuez à prendre votre médicament comme avant. Ne prenez jamais plus d'une dose à la fois.

Que faire en cas de surdose?

Il ne faut pas prendre un nombre plus élevé de comprimés ou de capsules que ce que votre médecin vous a prescrit.

En cas de surdose accidentelle, communiquez immédiatement avec votre médecin, votre pharmacien, ou avec le **centre antipoison ou le service d'urgence de l'hôpital** de votre région même s'il n'y a pas de symptômes.

Quel est l'emploi approprié de DOXYTAB ?

- Suivez toutes les recommandations du médecin à la lettre.
- Si vous apprenez que vous êtes enceinte, cessez immédiatement de prendre DOXYTAB et communiquez avec votre médecin.
- Si vous êtes sur le point de prendre un nouveau médicament, signalez à votre médecin et votre pharmacien que vous prenez DOXYTAB .
- N'arrêtez pas de prendre votre médicament tant que votre médecin ne vous l'a pas indiqué, et ce, même si vous vous sentez mieux.
- N'utilisez pas DOXYTAB pour traiter un autre problème médical à moins de l'avis contraire du médecin.

Y a-t-il des effets secondaires avec DOXYTAB ?

DOXYTAB peut engendrer des effets secondaires, mais ils sont en général mineurs et temporaires. Cependant, certains effets peuvent être plus graves et nécessiter une intervention médicale. DOXYTAB peut causer les effets secondaires suivants : nausées, vomissements, diarrhée, perte d'appétit, douleurs abdominales, douleur en avalant ou difficulté à avaler, changement de couleur des dents, et éruptions cutanées.

DOXYTAB peut augmenter la fréquence des candidoses vaginales (infection) et causer une hypertension intracrânienne (pression du sang élevée dans le cerveau).

Des réactions de photosensibilité et des coups de soleil ont été signalés chez certaines personnes traitées par des tétracyclines. Si vous prévoyez être exposé directement à la lumière du soleil, appliquez un écran solaire ou prenez d'autres mesures pour vous protéger. Évitez toute exposition excessive au soleil ou aux rayons ultraviolets artificiels. En cas de réaction phototoxique (p. ex. éruption cutanée), cessez de prendre votre médicament.

Si vous ressentez un des effets secondaires suivants lors de la prise de ce médicament, communiquez sans attendre avec votre médecin ou votre pharmacien :

- diarrhée, diarrhée aqueuse ou présence de sang dans les selles, accompagnées ou non de crampes à l'estomac et de fièvre, communiquez le plus rapidement possible avec votre médecin.

Communiquez à votre médecin ou votre pharmacien, et cesser de prendre DOXYTAB , si vous souffrez l'un des effets secondaires suivants lors de la prise de ce médicament

- Vous développez une réaction d'hypersensibilité (allergique) qui peut inclure des symptômes tels que la difficulté à respirer, des palpitations, des étourdissements, des démangeaisons, des éruptions cutanées et des cloques.
- Vous développez des symptômes tels que le gonflement des mains et des pieds, des douleurs musculaires et articulaires et une éruption cutanée, car ceux-ci peuvent être des signes d'une réaction auto-immune.

Si vous manifestez une réaction quelconque pendant le traitement par DOXYTAB, communiquez sans délai avec votre médecin ou votre pharmacien, même si vous pensez qu'il n'y a pas de lien entre cet effet et le médicament, et que cet effet ne figure pas sur la liste des effets énumérés dans ce dépliant.

Comment conserver DOXYTAB ?

Conservez le médicament à la température ambiante, entre 15 et 30 °C (59-86 °F). Éviter de l'exposer à la lumière.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption qui figure sur l'emballage et l'étiquette.

Gardez toujours les médicaments hors de portée des enfants. Ce médicament pourrait leur nuire.

Vous pouvez déclarer tout effet indésirable que vous soupçonnez être associé à la prise de produits de santé au Programme Canada Vigilance, et ce, de l'une des trois façons suivantes :

- ❖ En ligne à <http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/index-fra.php>
- ❖ Par téléphone, au numéro sans frais : 1-866-234-2345
- ❖ En remplissant le formulaire de déclaration de Canada Vigilance et en le faisant parvenir :
 - Par télécopieur, au numéro sans frais : 1-866-234-6789, ou
 - Par la poste à l'adresse suivante :
Programme Canada Vigilance
Santé Canada
Indice postal 0701C
Ottawa (ON) K1A 0K9

L'étiquette affranchie, le formulaire de déclaration de Canada Vigilance et les lignes directrices de déclaration des effets indésirables sont disponibles sur le site Web de MedEffet^{MC} Canada à l'adresse suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/index-fra.php.

REMARQUE : Si vous désirez de plus amples renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, prière de communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Dernière révision : 30 novembre 2015