

RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

Pr PRO-FLUCONAZOLE

Comprimés de fluconazole, norme maison

Le présent dépliant s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Ce dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de PRO-FLUCONAZOLE. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT**Les raisons d'utiliser ce médicament :**

PRO-FLUCONAZOLE appartient à une famille de médicaments appelés antifongiques.

Votre médecin vous a prescrit PRO-FLUCONAZOLE, qui est employé pour traiter les infections fongiques (c'est-à-dire, qui sont causées par des champignons, comme les levures). Ce médicament peut aussi être utilisé pour vous empêcher d'attraper une infection fongique. La levure *Candida* est la cause la plus fréquente d'infection fongique.

Les effets de ce médicament :

PRO-FLUCONAZOLE empêche de façon sélective la production normale de stéroïdes dans les champignons et contribue ainsi à stopper la croissance de ces derniers.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

Vous ne devez pas utiliser PRO-FLUCONAZOLE si vous avez déjà fait une réaction allergique :

- à n'importe lequel des ingrédients de PRO-FLUCONAZOLE (voir les ingrédients non médicinaux sont)
- à d'autres médicaments pour traiter une infection fongique.

Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure : démangeaisons, rougeur de la peau ou difficulté à respirer.

Ne prenez pas PRO-FLUCONAZOLE si vous prenez, en particulier, l'un ou l'autre des médicaments suivants :

- cisapride* (un médicament qui agit sur la motilité gastro-intestinale);
- terféndine* ou astémizole* (des antihistaminiques contre les allergies);
- érythromycine (un antibiotique pour traiter les infections);
- pimozide (pour le traitement de la schizophrénie) et;
- quinidine (un médicament utilisé pour traiter les battements de cœur irréguliers).

* Non commercialisé au Canada

L'ingrédient médicinal est :

Le fluconazole

Les ingrédients non médicinaux sont :

Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, FD&C rouge n°3 et n°40 sur substrat, phosphate de calcium dibasique anhydre, povidone, et stéarate de magnésium.

Les formes posologiques sont :

Comprimés: 100 mg

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Informez votre médecin si vous tombez enceinte pendant votre traitement par PRO-FLUCONAZOLE.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT d'utiliser PRO-FLUCONAZOLE si :

- vous avez une maladie du foie ou des reins;
- vous êtes allergique à tout autre médicament, y compris ceux employés pour traiter les infections à levures ou d'autres infections fongiques;
- la teneur de votre sang en potassium, en calcium ou en magnésium est anormale;
- vous êtes enceinte ou prévoyez une grossesse;
- vous allaitez votre bébé ou prévoyez le faire, car PRO-FLUCONAZOLE passe dans le lait maternel. On recommande aux mères prenant PRO-FLUCONAZOLE de ne pas allaiter;
- vous avez une maladie du cœur ou des problèmes cardiaques, une maladie du sang ou tout autre problème médical;
- vous conduisez un véhicule ou utilisez des machines. On doit tenir compte du fait que le médicament peut parfois causer des étourdissements ou des crises convulsives;
- vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris ceux qui sont vendus sans ordonnance.

Administration à l'enfant

Votre médecin déterminera si ce médicament convient à votre enfant.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**Les médicaments qui sont susceptibles d'interagir avec PRO-FLUCONAZOLE :**

- alfentanil, fentanyl ou méthadone (pour soulager la douleur)
- amitriptyline, nortriptyline (pour traiter la migraine et d'autres maladies)
- amphotéricine B et voriconazole (pour traiter les infections fongiques)
- anticoagulants de type coumarinique (pour éclaircir le sang et empêcher la formation de caillots)
- anti-inflammatoires non stéroïdiens (comme l'acide acétylsalicylique [aspirine] et l'ibuprofène), qui sont utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre
- benzodiazépines, p. ex., midazolam, triazolam ou médicaments similaires (pour aider à dormir ou soulager

- l'anxiété)
- bloqueurs des canaux calciques ou losartan (pour faire baisser la pression sanguine)
 - carbamazépine ou phénytoïne (pour traiter l'épilepsie)
 - célécoxib (pour traiter certaines formes d'arthrite et d'autres types de douleur)
 - cimétidine (pour traiter les brûlures d'estomac et les ulcères gastroduodénaux)
 - contraceptifs oraux
 - cyclophosphamide ou alcaloïdes de la pervenche (pour traiter certaines formes de cancer)
 - cyclosporine, sirolimus ou tacrolimus (pour prévenir le rejet d'organes)
 - diurétiques (médicaments qui font uriner, comme l'hydrochlorothiazide, utilisés pour diminuer la rétention d'eau et abaisser la pression sanguine)
 - halofantrine (pour traiter la malaria)
 - inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (statines; pour abaisser le taux de cholestérol)
 - médicaments pour traiter les infections (antibiotiques), comme l'azithromycine, l'érythromycine, la rifampine ou la rifabutine
 - prednisone (pour traiter de nombreux types de maladies inflammatoires et d'allergies)
 - saquinavir ou zidovudine, aussi appelée AZT (pour traiter les patients atteints du VIH)
 - sulfonylurées et autres hypoglycémiantes oraux (médicaments contre le diabète)
 - théophylline (pour traiter l'asthme)
 - tofacitinib (pour traiter la polyarthrite rhumatoïde)
 - vitamine A (sous forme d'acide rétinoïque utilisé pour traiter l'acné)

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Posologie habituelle :

Prenez PRO-FLUCONAZOLE exactement tel que vous l'a prescrit votre médecin.

Surdose :

En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, l'urgence d'un centre hospitalier ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que possible. Toutefois, s'il est presque temps de prendre la dose suivante, sautez la dose oubliée et reprenez l'horaire posologique prescrit par votre médecin. Ne doublez pas la dose pour compenser la dose oubliée.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES EFFETS SECONDAIRES

Comme c'est le cas pour tous les médicaments, PRO-FLUCONAZOLE peut causer des effets secondaires. Les effets secondaires les plus fréquents sont les suivants :

- maux de tête;
- éruption cutanée;
- douleur au ventre;
- diarrhée;
- nausées et vomissements.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET PROCÉDURES À SUIVRE

Symptôme / effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et faites appel à un service d'urgence médicale immédiatement
	Seulement pour les effets secondaires graves	Dans tous les cas	
Atteintes cutanées exfoliatives : réaction cutanée grave, comme une éruption accompagnée de cloques ou de démangeaisons partout sur le corps, de rougeur de la peau ou de taches rouges qui démangent, d'un gonflement des paupières, du visage ou des lèvres ou de desquamation (peau qui pèle).		✓	
Nécrose hépatique : mort des cellules du foie qui peut être accompagnée de douleur au ventre, d'une urine foncée, de fièvre, de selles de couleur pâle et de jaunisse (coloration jaune de la peau et du blanc des yeux)		✓	
Troubles cardiaques : battements du cœur irréguliers ou anomalies du rythme cardiaque (p. ex., prolongement de l'intervalle QT, torsades de pointes)		✓	
Réaction allergique accompagnée de symptômes tels que : enflure du visage, de la gorge, de la bouche ou des extrémités, difficulté à respirer, éruption ou démangeaisons			✓

Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive. Pour tout effet inattendu ressenti lors de la prise de PRO-FLUCONAZOLE, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien immédiatement.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Conserver entre 15 °C et 30 °C.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Signalement des effets secondaires

Vous pouvez contribuer à l'amélioration de l'utilisation sécuritaire des produits de santé pour les Canadiens en signalant tout effet secondaire grave ou imprévu à Santé Canada. Votre déclaration peut nous permettre d'identifier des nouveaux effets secondaires et de changer les renseignements liés à l'innocuité des produits.

3 façons de signaler :

- Faire une déclaration en ligne au [MedEffet](http://www.santecanada.gc.ca/medeffet) (www.santecanada.gc.ca/medeffet);
- Téléphoner au numéro sans frais 1-866-234-2345; ou
- Envoyer un formulaire de déclaration des effets secondaires du consommateur par télécopieur ou par la poste :
 - Numéro de télécopieur sans frais 1-866-678-6789
 - Adresse postale : Programme Canada Vigilance
Santé Canada
Indice de l'adresse : 0701E
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9

Des étiquettes d'adresse prépayées et le formulaire sont disponibles au [MedEffet](http://www.santecanada.gc.ca/medeffet) (www.santecanada.gc.ca/medeffet).

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

On peut obtenir ce document et la monographie complète du produit, rédigée pour les professionnels de la santé, en communiquant Pro Doc Ltée au 1-800-361-8559, www.prodoc.qc.ca ou info@prodoc.qc.ca.

La présente notice a été préparée par Pro Doc Ltée, Laval (Québec) H7L 3W9

Dernière révision : 26 août 2016