

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

LOPERAMIDE-2

Comprimés de chlorhydrate de loperamide, USP

Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre **LOPERAMIDE-2** et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Discutez de votre état de santé et de votre traitement avec votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **LOPERAMIDE-2**.

Pourquoi LOPERAMIDE-2 est-il utilisé ?

- Soulagement rapide des symptômes liés à la diarrhée

Comment LOPERAMIDE-2 agit-il ?

LOPERAMIDE-2 rend les selles plus moulées et moins fréquentes.

Quels sont les ingrédients dans LOPERAMIDE-2?

Ingrédient médicamenteux : chlorhydrate de loperamide

Ingrédients non médicamenteux : Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, D&C jaune n°10 sur substrat d'aluminium, FD&C bleu n°1 sur substrat d'aluminium, lactose monohydraté, povidone et stéarate de magnésium.

LOPERAMIDE-2 est disponible sous les formes posologiques suivantes :

Caplets à 2 mg

Ne prenez pas LOPERAMIDE-2:

- si vous avez du sang dans les selles ou vous avez de la fièvre;
- si vous êtes constipé, ou votre abdomen est gonflé ou douloureux;
- vous souffrez d'une infection bactérienne dans votre appareil digestif, ou pensez souffrir d'un empoisonnement alimentaire causé par une bactérie;
- si vous présentez une inflammation du gros intestin;
- si vous prenez des médicaments d'ordonnance qui peuvent causer de la constipation tels que les antipsychotiques et les antidépresseurs;
- si vous prenez des antibiotiques ou vous êtes atteint de colite ulcéreuse;
- chez les enfants de moins de 12 ans, sauf sur l'avis d'un médecin;
- si vous êtes sensible à l'un des ingrédients ou à toute autre composante de cette formule (consulter la section **Quels sont les ingrédients dans LOPERAMIDE-2?**);
- si vous n'êtes pas certain, consultez votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir des conseils.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre LOPERAMIDE-2, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et pour assurer la bonne utilisation du médicament.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- si vous avez du mucus dans vos selles;
- si vous êtes enceinte ou vous allaitez (LOPERAMIDE-2 n'est pas recommandé chez les mères qui allaitent parce qu'une petite quantité de loperamide pourrait passer dans le lait);
- si vous souffrez de méningite ou de maladie du foie, car vous pourriez avoir besoin de surveillance médicale pendant que vous prenez LOPERAMIDE-2;
- si vous avez des antécédents de rythme cardiaque anormal (p. ex. syndrome de Brugada).

Autres mises en garde à connaître :

Avertissement concernant la posologie :

La prise d'une dose plus élevée que celle recommandée dans le mode d'emploi peut causer de graves problèmes cardiaques ou même la mort.

CESSER L'EMPLOI et consulter votre médecin ou votre pharmacien si :

- la diarrhée s'aggrave, dure plus de 48 heures ou s'accompagne de symptômes inhabituels;
- vous êtes infecté par le VIH et présentez des signes de gonflement abdominal.

Même si LOPERAMIDE-2 maîtrise la diarrhée, il n'en traitera pas la cause. Dans la mesure du possible, la cause de la diarrhée devrait aussi être traitée.

De la fatigue, des étourdissements ou de la somnolence peuvent se produire dans le contexte des syndromes diarrhéiques traités par le loperamide. C'est pourquoi la prudence est de mise chez les personnes qui conduisent un véhicule ou qui prennent les commandes d'une machine.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les médicaments alternatifs.

Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec LOPERAMIDE-2:

- médicaments qui ralentissent les fonctions de l'estomac et des intestins (comme certains antidépresseurs et médicaments contre le rhume et les allergies), car ceux-ci peuvent intensifier l'action de LOPERAMIDE-2;
- sédatifs;
- ritonavir (pour traiter le VIH);
- quinidine (pour traiter un rythme cardiaque anormal);
- desmopressine par voie orale (pour traiter une miction excessive);
- itraconazole ou kétoconazole (pour traiter les infections fongiques);
- gemfibrozil (pour réduire le taux de cholestérol).

Comment prendre LOPERAMIDE-2:

- LOPERAMIDE-2 doit être administré par voie orale. Vous pouvez le prendre à toute heure de la journée.
- Les caplets se prennent avec un liquide.
- Lorsque vous avez la diarrhée, celle-ci s'accompagne d'une forte perte de liquides. Il faut donc boire beaucoup de liquides clairs, de l'eau, des jus non sucrés ou du bouillon.
- S'abstenir de consommer de l'alcool ou du lait et éviter les fruits, les légumes verts et les mets gras ou épicés, qui peuvent aggraver la diarrhée.

Dose habituelle:

Adultes (12 ans et plus) : Prendre 2 caplets pour commencer, puis 1 caplet après chaque selle molle, jusqu'à un maximum de 8 caplets par jour. Cesser l'utilisation du produit lorsque les selles deviennent moulées ou dures, ou lorsque 24 heures se sont écoulées depuis les dernières selles.

Surdosage :

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop de LOPERAMIDE-2, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à LOPERAMIDE-2?

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez LOPERAMIDE-2. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

LOPERAMIDE-2 est généralement bien toléré et occasionne peu d'effets indésirables lorsqu'il est pris selon son mode d'emploi.

Ce médicament peut entraîner de la constipation. Dans ce cas, cesser de prendre LOPERAMIDE-2 et, si les réactions sont graves, consulter un médecin.

Les réactions d'hypersensibilité à LOPERAMIDE-2 sont rares. Elles peuvent se manifester par des éruptions cutanées ou des démangeaisons. Si de tels symptômes apparaissent, consulter votre médecin.

Les indispositions suivantes peuvent se produire, quoiqu'elles puissent aussi être causées par la diarrhée : nausées et vomissements, fatigue, étourdissements ou somnolence, sécheresse buccale et flatulence.

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre ce médicament et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
RARE			
Douleur abdominale		✓	✓
Difficulté à uriner		✓	✓
Ballonnement		✓	✓
Essoufflement		✓	✓
Enflure du visage		✓	✓
Coordination anormale		✓	✓
Tension musculaire		✓	✓
Contraction pupillaire		✓	✓
Douleur abdominale haute		✓	✓

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit à Santé Canada en :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur; ou
- Téléphonant sans frais au 1 866 234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

Entreposage :

Conserver à la température ambiante entre 15 °C et 30 °C.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir davantage au sujet LOPERAMIDE-2:

- Communiquer avec votre professionnel de la santé
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>); ou communiquez avec Pro Doc Ltée : 1-800-361-8559, www.prodoc.qc.ca, medinfo@prodoc.qc.ca

Ce feuillet a été rédigé par Pro Doc Ltée.

Laval, Québec, H7L 3W9

Dernière révision : 26 mars 2024