

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

Pr ACEBUTOLOL – 100

Pr ACEBUTOLOL – 200

Pr ACEBUTOLOL – 400

(chlorhydrate d'acébutolol)

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie d'une « monographie de produit » publiée pour ACEBUTOLOL au Canada et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet d'ACEBUTOLOL. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Les raisons d'utiliser ce médicament :

ACEBUTOLOL abaisse la tension artérielle élevée (hypertension). ACEBUTOLOL peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments pour traiter cette affection.

ACEBUTOLOL sert aussi à traiter les douleurs à la poitrine (angine) causées par une ischémie du cœur (maladie causée par l'accumulation de plaque le long des parois internes des artères du cœur, ce qui rétrécit les artères et réduit la circulation vers le cœur).

Les effets de ce médicament :

ACEBUTOLOL appartient à une classe de médicaments appelés « bêtabloquants ». Ces agents bloquent l'action sur le cœur de certaines substances chimiques qui augmentent la tension artérielle et la fréquence cardiaque.

Ce médicament ne guérit pas votre maladie. Il aide à la maîtriser. Par conséquent, il est important de continuer à prendre ACEBUTOLOL régulièrement, même si vous vous sentez bien.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

Ne prenez pas ACEBUTOLOL si vous :

- avez un problème médical, surtout un trouble du rythme cardiaque, une insuffisance cardiaque, une faible tension artérielle (hypotension) ou d'autres troubles du cœur ou de la circulation;
- avez une tumeur de la glande surrénale;

- êtes allergique ou hypersensible au chlorhydrate d'acébutolol, à d'autres bêtabloquants ou à tout autre ingrédient non médicinal d'ACEBUTOLOL.

L'ingrédient médicinal est :

le chlorhydrate d'acébutolol.

Les ingrédients non médicinaux sont :

cire de carnauba, dextrates, dioxyde de titane, hydroxypropylméthylcellulose, polyéthylène glycol, silice colloïdale et stéarate de magnésium.

Les formes posologiques sont :

Comprimés à 100 mg, à 200 mg et à 400 mg.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Consultez votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien AVANT d'utiliser ACEBUTOLOL si :

- vous souffrez de psoriasis;
- vous souffrez d'hyperthyroïdie;
- vous avez une maladie du foie ou du rein;
- vous avez déjà souffert d'insuffisance cardiaque ou avez un problème cardiaque quelconque;
- vous souffrez d'asthme, de bronchite, d'emphysème ou d'une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC);
- vous prenez d'autres médicaments sur ordonnance ou en vente libre;
- vous souffrez d'allergies;
- vous souffrez de diabète ou d'autres problèmes liés à la glycémie;
- **vous êtes enceinte ou songez à tomber enceinte.** La prise
- d'ACEBUTOLOL pendant la grossesse peut vous causer du tort, à vous ou à votre enfant;
- **vous allaitez.** ACEBUTOLOL passe dans le lait maternel. Vous ne devriez pas allaiter en prenant ACEBUTOLOL;
- vous avez moins de 18 ans.

Si vous devez subir une opération dentaire ou toute autre intervention chirurgicale, dites à votre dentiste ou à votre chirurgien que vous prenez ACEBUTOLOL.

Conduite automobile et utilisation de machines :

Attendez de voir comment vous répondez à ACEBUTOLOL avant d'effectuer des tâches qui requièrent une attention particulière. Les étourdissements et/ou la fatigue peuvent en particulier se produire après la première dose et lorsque la dose est augmentée.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Comme avec la plupart des médicaments, les interactions avec d'autres médicaments sont possibles. Mentionnez à votre médecin, à votre infirmière ou à votre pharmacien tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sur ordonnance et les médicaments en vente libre.

Les médicaments suivants peuvent interagir avec ACEBUTOLOL :

- les médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, y compris la clonidine et les inhibiteurs calciques (p. ex. le vérapamil administré par voie orale, le diltiazem). Votre médecin doit surveiller étroitement votre état si vous prenez des médicaments en association avec ACEBUTOLOL. Vous pourriez aussi être exposé à un risque accru de dépression si vous utilisez du diltiazem avec ACEBUTOLOL;
- la réserpine, un médicament utilisé pour traiter l'hypertension et l'agitation grave;
- les médicaments utilisés pour traiter l'angine de poitrine (douleur thoracique), l'hypertension (tension artérielle élevée) et les rythmes cardiaques anormaux, tels que les bêtabloquants (p. ex. l'aténolol, le bétaxolol, le bisoprolol);
- les médicaments retrouvés dans certains remèdes contre le rhume et certaines gouttes pour le nez (p. ex. la noradrénaline, l'isoprénaline, l'éphédrine, la phényléphrine, la phénylpropanolamine et les dérivés de la xanthine);
- les médicaments utilisés pour traiter les troubles du rythme cardiaque (p. ex. la disopyramide, l'amiodarone);
- la digoxine (un médicament pour le cœur);
- le fingolimod, un médicament utilisé pour traiter la sclérose en plaques;
- les médicaments utilisés pour traiter l'asthme, la bronchite, l'emphysème ou les maladies pulmonaires (p. ex. les bronchodilatateurs comme l'albutérol, l'épinéphrine, le salmétérol et la terbutaline);
- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) utilisés pour réduire la douleur et l'enflure (p. ex. l'ibuprofène, le naproxène et le célécoxib);
- les médicaments utilisés pour traiter la dépression, les convulsions, la schizophrénie ou les troubles psychotiques (p. ex. les antidépresseurs tricycliques, les barbituriques, les phénothiazines et les inhibiteurs de la monoamine-oxydase);
- les médicaments utilisés pour l'anesthésie (p. ex. l'éther, le cyclopropane et le trichloréthylène).

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Votre médecin établira votre dose en fonction de vos besoins médicaux individuels et expliquera quand et comment prendre ACEBUTOLOL. Prenez ACEBUTOLOL exactement comme prescrit. Il est recommandé de prendre votre dose à peu près au même moment chaque jour. ACEBUTOLOL peut être pris avec ou sans nourriture.

Dose habituelle pour un adulte :

Pour traiter l'hypertension :

La dose de départ habituelle est de 100 mg deux fois par jour. Dans certains cas, votre médecin peut vous prescrire une dose plus élevée ou prescrire ACEBUTOLOL en association avec d'autres médicaments pour traiter votre hypertension.

Pour traiter les douleurs à la poitrine causées par une maladie du cœur :

La dose de départ habituelle est de 200 mg deux fois par jour. Dans certains cas, votre médecin peut prescrire une dose plus élevée si nécessaire, jusqu'à une dose maximale recommandée de 300 mg deux fois par jour.

Chez les personnes âgées et les patients ayant des troubles du rein ou du foie :

On utilise en général des doses moins élevées chez les patients plus âgés et chez ceux qui ont des troubles du rein.

Ne cessez pas de prendre ACEBUTOLOL et ne modifiez pas votre dose sans d'abord en parler à votre médecin. Des effets secondaires graves comme des douleurs à la poitrine ou une crise cardiaque peuvent se produire si vous arrêtez brusquement de prendre ce médicament.

Surdose :

Si vous pensez que vous avez pris trop d'ACEBUTOLOL, communiquez avec votre médecin, votre infirmière, votre pharmacien, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région immédiatement, même si vous n'avez pas de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous manquez une dose, sautez la dose oubliée et prenez la dose suivante à l'heure habituelle. Ne doublez pas la dose.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Les effets secondaires pourraient comprendre :

- la fatigue;
- les nausées;
- les étourdissements;
- les éruptions cutanées.

Signalez tout effet secondaire à votre médecin. ACEBUTOLOL peut causer des résultats anormaux aux tests sanguins. Votre médecin va décider quand effectuer des tests sanguins et va interpréter les résultats.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE

Symptôme/effet		Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou à votre pharmacien
		Cas graves	Dans tous les cas	
Fréquent	Basse tension artérielle : étourdissements, évanouissement, sensation de tête légère. Peut se produire si vous passez de la position couchée ou assise à la position debout.	√		
	Éruptions cutanées.		√	
	Nausées.	√		
Peu fréquent	Yeux secs.		√	
	Rétrécissement des voies respiratoires (bronchospasme) ou autre trouble des poumons.		√	
	Syndrome ressemblant au lupus : douleurs aux articulations, aux muscles ou à		√	

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE

	la poitrine lorsque vous toussiez ou respirez, difficulté à respirer (essoufflement ou respiration difficile).			
	Insuffisance cardiaque congestive : rythme cardiaque irrégulier, faible fréquence cardiaque ou autres changements des symptômes cardiaques.		√	
	Inflammations des poumons/pneumonie : toux, essoufflement, douleurs à la poitrine ou fièvre.		√	
	Augmentation de la sensibilité ou des réactions aux allergènes.		√	
Fréquence inconnue	Troubles hépatiques : jaunissement de la peau ou des yeux, urine foncée, douleur abdominale, nausées, vomissements, perte d'appétit.		√	

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. En cas d'effet inattendu ressenti lors de la prise d'ACEBUTOLOL, veuillez communiquer avec votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Gardez ACEBUTOLOL et tous les autres médicaments hors de la portée et de la vue des enfants. Conservez-le à une température se situant entre 15 et 30 °C. Gardez-le à l'abri de la lumière.

Apportez les comprimés ACEBUTOLOL périmés ou dont vous n'avez plus besoin à votre pharmacie ou au centre de gestion des déchets de votre municipalité.

Déclaration d'effets secondaires

Pour déclarer les effets secondaires soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé à Santé Canada :

- Consultez la page Web « Déclaration des effets indésirables » (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour obtenir de l'information sur la façon de déclarer les effets indésirables en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- Composez le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur ACEBUTOLOL :

- vous pouvez communiquer avec votre professionnel de la santé;

vous pouvez obtenir la monographie de produit complète préparée à l'intention des professionnels de la santé (qui contient les renseignements pour le consommateur), en visitant le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html>) ou en communiquant avec Pro Doc Ltée au 1-800-361-8559, www.prodociqc.ca ou info@prodociqc.ca

La présente notice a été préparée par
Pro Doc Ltée, Laval (Québec) H7L 3W9

Dernière révision : 07 juin 2019